


Choc anaphylactique



Fiche d'identification de l'enfant

À compléter par le parent

Nom de l'enfant : _____

Date de naissance : _____

Noms et prénoms :

Du père : _____

De la mère : _____

Du tuteur : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

maison

travail père

travail mère

travail tuteur

En l'absence des parents, autre personne à rejoindre en cas d'urgence :

À compléter par le médecin

Informations médicales

A. Diagnostic : _____

B. Allergène : _____

C. Manifestation : _____

D. Médication, dosage et administration

Signature du médecin

Date

N.B. : Concernant l'injection d'adrénaline, nous privilégions **Épipen** pour sa facilité d'utilisation en milieu de garde.

À compléter par la RSG

Date : _____ Heure : _____

Symptômes présentés :

- Enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge;
- Plaques rouges généralisées sur le corps;
- Difficulté à avaler, à respirer (respiration bruyante);
- Nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominales;
- Perte de conscience;
- État de choc.
- Autres : _____

PROCÉDURE À SUIVRE

Dès les premiers symptômes :

1. Questionner l'enfant sur ce qu'il a mangé ou touché;
2. Si contact avec les sources d'allergie ou apparition d'un ou plusieurs symptômes : **DONNER IMMÉDIATEMENT L'INJECTION D'ADRÉNALINE;**
3. Appeler l'ambulance au 589-3711

En attendant l'ambulance :

- AVISER LES PARENTS**
- Rassurer, desserrer les vêtements;
- Installer confortablement : au début en position semi-assis; si détérioration, coucher sur le côté, surélever les jambes.
- Garder à jeun et au chaud;
- Inscrire l'heure à laquelle l'adrénaline a été donnée et informer les ambulanciers.
- Accompagner l'enfant si possible et apporter la fiche d'identification de l'enfant sinon, aviser les services d'urgence du centre hospitalier.